


VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL (VRS)

GUÍA DE SEGUIMIENTO



El VRS es impredecible y todos los bebés están en riesgo. Creamos una guía con información de los CDC para ayudarte a comprender lo que tu bebé podría experimentar a medida que avanza el VRS.

DÍAS 1-2

Lo que puede estar sucediendo en los días 1-2:

- El bebé inhala gotitas que contienen el VRS

Los síntomas incluyen:

- No hay síntomas

DÍAS 3-5

Lo que puede estar sucediendo en los días 3-5:

- El VRS daña células en el oído, la nariz y la garganta

Los síntomas incluyen:

- Congestión
- Nariz mucosa
- Fiebre
- Irritabilidad
- Disminución del apetito

DÍAS 6-8

Lo que puede estar sucediendo en los días 6-8:

- El VRS infecta las células profundas en los pulmones

Los síntomas incluyen:

- Tos
- Respiración rápida
- Silbidos y/o ronquidos al respirar
- Aleteo nasal
- Movimiento anormal del pecho al respirar

Si notas algo de lo siguiente en tu bebé, comunícate de inmediato con tu médico:

- **Respiración corta, superficial y anormalmente rápida:** Busca si hay retracciones de la pared torácica. Piensa en las retracciones de la pared torácica como un "hundimiento" del tórax entre y debajo de las costillas.
- Tu bebé emite **silbidos** cuando tose.
- **Aleteo nasal:** Cuando **las fosas nasales de tu bebé se abren** con cada respiración.
- Tu bebé está **inusualmente cansado o tiene un tono azulado** en los labios o las uñas.
- Tu bebé tiene **poco apetito o no se alimenta bien.**
- **Tu bebé tiene fiebre:** 100.4°F / 38°C o más para un bebé menor de 3 meses. 102.2°F / 39°C o más para un bebé mayor de 3 meses..

ENTÉRATE ACERCA DEL VRS EN [CONOCEVRS.COM](https://www.conocevrs.com)

MAT-US-2206376-v1.0-09/2022.